

D-I-A-M-O-N-D-S-

D-I-A-M-O-N-D-S-

Médicament pour essai clinique
Zur klinischen Prüfung bestimmt
Solo per studio clinico
For clinical use only

**Ne pas ouvrir dans la pharmacie.
Ne pas accepter un emballage déjà ouvert.
Nicht in der Apotheke zu öffnen.
Eine geöffnete Schachtel ist zurückzuweisen.
Non aprire nella farmacia.
Rifutare la confezione se è già aperta.
Not to be open in the pharmacy.
Do not accept if package is open.**

Tenir hors de portée des enfants/d'autres personnes.
Für Kinder/andere Personen unerreichbar aufbewahren.
Keep out of the reach of children/other people.

Novartis Consumer Health SA, 1260 Nyon, Switzerland

17727A-510.10-01-00-CH+F

Dès l'apparition des symptômes, prendre une dose initiale de 2 comprimés. Si nécessaire, prendre ensuite 1 ou 2 comprimés toutes les 4 à 6 heures. Ne pas prendre plus de 6 comprimés par jour. Ne pas dépasser 5 jours de traitement en cas de douleurs ou 3 jours en cas de fièvre. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin afin de vous assurer qu'ils ne sont pas dus à une autre maladie.

Nehmen Sie eine Anfangsdosis von 2 Tabletten, sobald die Symptome auftreten. Falls erforderlich, nehmen Sie zusätzlich 1 oder 2 Tabletten alle 4 bis 6 Stunden. Sie dürfen nicht mehr als 6 Tabletten pro Tag einnehmen. Nehmen Sie diese Tabletten nicht mehr als 5 Tage lang für Schmerzen oder 3 Tage lang für Fieber, ohne Ihren Arzt zu fragen. Falls die Symptome andauern, sehen Sie Ihren Arzt, um sicher zu stellen, dass sie nicht durch ein anderes Leiden bedingt sind.

Prendere una dose iniziale di 2 compresse all'apparizione dei sintomi. Se necessario, prendere in seguito 1 o 2 compresse ogni 4 o 6 ore. Non prendere le compresse per più di 5 giorni contro i dolori o 3 giorni contro la febbre senza consultare il suo medico. Se i sintomi persistono, consulti il suo medico per accertare che non sono dovuti ad un'altra malattia.

Take an initial dose of 2 tablets when symptoms appear. If needed, continue with 1 or 2 tablets every 4 to 6 hours. Do not take for more than 6 tablets per day. Do not take for more than 5 days for pain or 3 days for fever without consulting your doctor. If symptoms persist, consult your doctor to make sure that they are not due to another illness.

Lot/Lotno/Batch 35229/29964/81002/476304
Date d'expiration/Verwendbar bis/Scadenza/Expiry date: 02.2004



D . I . A . M . O . N . D . S .

Dès l'apparition des symptômes, prendre une dose initiale de 2 comprimés. Si nécessaire, prendre ensuite 1 ou 2 comprimés toutes les 4 à 6 heures. Ne pas prendre plus de 6 comprimés par jour. Ne pas dépasser 5 jours de traitement en cas de douleurs ou 3 jours en cas de fièvre. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin afin de vous assurer qu'ils ne sont pas dus à une autre maladie.

Nehmen Sie eine Anfangsdosis von 2 Tabletten, sobald die Symptome auftreten. Falls erforderlich, nehmen Sie zusätzlich 1 oder 2 Tabletten alle 4 bis 6 Stunden. Sie dürfen nicht mehr als 6 Tabletten pro Tag einnehmen. Nehmen Sie diese Tabletten nicht mehr als 5 Tage lang für Schmerzen oder 3 Tage lang für Fieber, ohne Ihren Arzt zu fragen. Falls die Symptome andauern, sehen Sie Ihren Arzt, um sicher zu stellen, dass sie nicht durch ein anderes Leiden bedingt sind.

Prendere una dose iniziale di 2 compresse all'apparizione dei sintomi. Se necessario, prendere in seguito 1 o 2 compresse ogni 4 o 6 ore. Non prendere le compresse per più di 5 giorni contro i dolori o 3 giorni contro la febbre senza consultare il suo medico. Se i sintomi persistono, consulti il suo medico per accertare che non sono dovuti ad un'altra malattia.

Take an initial dose of 2 tablets when symptoms appear. If needed, continue with 1 or 2 tablets every 4 to 6 hours. Do not take for more than 6 tablets per day. Do not take for more than 5 days for pain or 3 days for fever without consulting your doctor. If symptoms persist, consult your doctor to make sure that they are not due to another illness.

PA:
88888

D . I . A . M . O . N . D . S .

Médicament pour essai clinique
Zur klinischen Prüfung bestimmt
Solo per studio clinico
For clinical use only

**Ne pas ouvrir dans la pharmacie.
Nicht in der Apotheke zu öffnen.
Eine geöffnete Schachtel ist zurückzuweisen.
Do not accept if package is open.**

Tenir hors de portée des enfants/d'autres personnes.
Für Kinder/andere Personen unerreichbar aufbewahren.
Keep out of the reach of children/other people.

Novartis Consumer Health SA, 1260 Nyon, Switzerland

17727A-510.10-01-00-CH+F

Lot/Lotus/Batch 35229/29964/B1002/A763 04
Date d'expiration/Verwendbar bis/Scadenza/Expiry date: 02.2004

Dès l'apparition des symptômes, prendre une dose initiale de 2 comprimés. Si nécessaire, prendre ensuite 1 ou 2 comprimés toutes les 4 à 6 heures. Ne pas prendre plus de 6 comprimés par jour. Ne pas dépasser 5 jours de traitement en cas de douleurs ou 3 jours en cas de fièvre. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin afin de vous assurer qu'ils ne sont pas dus à une autre maladie.

Nehmen Sie eine Anfangsdosis von 2 Tabletten, sobald die Symptome auftreten. Falls erforderlich, nehmen Sie zusätzlich 1 oder 2 Tabletten alle 4 bis 6 Stunden. Sie dürfen nicht mehr als 6 Tabletten pro Tag einnehmen. Nehmen Sie diese Tabletten nicht mehr als 5 Tage lang für Schmerzen oder 3 Tage lang für Fieber, ohne Ihren Arzt zu fragen. Falls die Symptome andauern, sehen Sie Ihren Arzt, um sicher zu stellen, dass sie nicht durch ein anderes Leiden bedingt sind.

Prendere una dose iniziale di 2 compresse all'apparizione dei sintomi. Se necessario, prendere in seguito 1 o 2 compresse ogni 4 o 6 ore. Non prendere le compresse per più di 5 giorni contro i dolori o 3 giorni contro la febbre senza consultare il suo medico. Se i sintomi persistono, consulti il suo medico per accertare che non sono dovuti ad un'altra malattia.

Take an initial dose of 2 tablets when symptoms appear. If needed, continue with 1 or 2 tablets every 4 to 6 hours. Do not take for more than 6 tablets per day. Do not take for more than 5 days for pain or 3 days for fever without consulting your doctor. If symptoms persist, consult your doctor to make sure that they are not due to another illness.

PA:
88888

D.I.A.M.O.N.D.S.

Médicament pour essai clinique
Zur klinischen Prüfung bestimmt
Solo per studio clinico
For clinical use only

**Ne pas ouvrir dans la pharmacie.
Ne pas accepter un emballage déjà ouvert.
Nicht in der Apotheke zu öffnen.
Eine geöffnete Schachtel ist zurückzuweisen.
Non aprire nella farmacia.
Rifutare la confezione se è già aperta.
Not to be open in the pharmacy.
Do not accept if package is open.**

Tenir hors de portée des enfants/d'autres personnes.
Für Kinder/andere Personen unerreichbar aufbewahren.
Keep out of the reach of children/other people.

Novartis Consumer Health SA, 1260 Nyon, Switzerland

17727A-510.10-01-00-CH+F

Lot/Lotnr/Batch 35229/29964/81002/A763 04
Date d'expiration/Verwendbar bis/Scadenza/Expiry date: 02.2004

D.I.A.M.O.N.D.S.



Dès l'apparition des symptômes, prendre une dose initiale de 2 comprimés. Si nécessaire, prendre ensuite 1 ou 2 comprimés toutes les 4 à 6 heures. Ne pas prendre plus de 6 comprimés par jour. Ne pas dépasser 5 jours de traitement en cas de douleurs ou 3 jours en cas de fièvre. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin afin de vous assurer qu'ils ne sont pas dus à une autre maladie.

Nehmen Sie eine Anfangsdosis von 2 Tabletten, sobald die Symptome auftreten. Falls erforderlich, nehmen Sie zusätzlich 1 oder 2 Tabletten alle 4 bis 6 Stunden. Sie dürfen nicht mehr als 6 Tabletten pro Tag einnehmen. Nehmen Sie diese Tabletten nicht mehr als 5 Tage lang für Schmerzen oder 3 Tage lang für Fieber, ohne Ihren Arzt zu fragen. Falls die Symptome andauern sehen Sie Ihren Arzt, um sicher zu stellen, dass sie nicht durch ein anderes Leiden bedingt sind.

Prendere una dose iniziale di 2 compresse all'apparizione dei sintomi. Se necessario, prendere in seguito 1 o 2 compresse ogni 4 o 6 ore. Non prendere le compresse per più di 5 giorni contro i dolori o 3 giorni contro la febbre senza consultare il suo medico. Se i sintomi persistono, consulti il suo medico per accertare che non sono dovuti ad un'altra malattia.

Take an initial dose of 2 tablets when symptoms appear. If needed, continue with 1 or 2 tablets every 4 to 6 hours. Do not take for more than 6 tablets per day. Do not take for more than 5 days for pain or 3 days for fever without consulting your doctor. If symptoms persist, consult your doctor to make sure that they are not due to another illness.

PA:
88888

D.I.A.M.O.N.D.S.

Médicament pour essai clinique
Zur klinischen Prüfung bestimmt
Solo per studio clinico
For clinical use only

Ne pas ouvrir dans la pharmacie.
Ne pas accepter un emballage déjà ouvert.
Nicht in der Apotheke zu öffnen.
Eine geöffnete Schachtel ist zurückzuweisen.
Non aprire nella farmacia.
Rifutare la confezione se è già aperta.
Not to be open in the pharmacy.
Do not accept if package is open.

Tenir hors de portée des enfants/d'autres personnes.
Für Kinder/andere Personen unerreichbar aufbewahren.
Keep out of the reach of children/other people.

Novartis Consumer Health SA, 1260 Nyon, Switzerland

17727A-510.10-01-00-CH+F

D.I.A.M.O.N.D.S.

Dès l'apparition des symptômes, prendre une dose initiale de 2 comprimés. Si nécessaire, prendre ensuite 1 ou 2 comprimés toutes les 4 à 6 heures. Ne pas prendre plus de 6 comprimés par jour. Ne pas dépasser 5 jours de traitement en cas de douleurs ou 3 jours en cas de fièvre. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin afin de vous assurer qu'ils ne sont pas dus à une autre maladie.

Nehmen Sie eine Anfangsdosis von 2 Tabletten, sobald die Symptome auftreten. Falls erforderlich, nehmen Sie zusätzlich 1 oder 2 Tabletten alle 4 bis 6 Stunden. Sie dürfen nicht mehr als 6 Tabletten pro Tag einnehmen. Nehmen Sie diese Tabletten nicht mehr als 5 Tage lang für Schmerzen oder 3 Tage lang für Fieber, ohne Ihren Arzt zu fragen. Falls die Symptome andauern, sehen Sie Ihren Arzt, um sicher zu stellen, dass sie nicht durch ein anderes Leiden bedingt sind.

Prendere una dose iniziale di 2 compresse all'apparizione dei sintomi. Se necessario, prendere in seguito 1 o 2 compresse ogni 4 o 6 ore. Non prendere le compresse per più di 5 giorni contro i dolori o 3 giorni contro la febbre senza consultare il suo medico. Se i sintomi persistono, consulti il suo medico per accertare che non sono dovuti ad un'altra malattia.

Take an initial dose of 2 tablets when symptoms appear. If needed, continue with 1 or 2 tablets every 4 to 6 hours. Do not take for more than 6 tablets per day. Do not take for more than 5 days for pain or 3 days for fever without consulting your doctor. If symptoms persist, consult your doctor to make sure that they are not due to another illness.

PA:
88888

D.I.A.M.O.N.D.S.

Médicament pour essai clinique
Zur klinischen Prüfung bestimmt
Solo per studio clinico
For clinical use only

Ne pas ouvrir dans la pharmacie.
Ne pas accepter un emballage déjà ouvert.
Nicht in der Apotheke zu öffnen.
Eine geöffnete Schachtel ist zurückzuweisen.
Non aprire nella farmacia.
Rifutare la confezione se è già aperta.
Not to be open in the pharmacy.
Do not accept if package is open.

Tenir hors de portée des enfants/d'autres personnes.
Für Kinder/andere Personen unerreichbar aufbewahren.
Keep out of the reach of children/other people.

Novartis Consumer Health SA, 1260 Nyon, Switzerland

17727A-510.10-01-00-CH+F

Lot/Lotno/Batch 35229/29964/81002/A763 04
Date d'expiration/Verwendbar bis/Scadenza/Expiry date: 02.2004

D.I.A.M.O.N.D.S.



D.I.A.M.O.N.D.S.

D.I.A.M.O.N.D.S.

Novartis Consumer Health SA, 1260 Nyon, Switzerland

17727A-510.10-01-00-CH+F

Nehmen Sie eine Anfangsdosis von 2 Tabletten, sobald die Symptome auftreten. Falls erforderlich, nehmen Sie zusätzlich 1 oder 2 Tabletten alle 4 bis 6 Stunden. Sie dürfen nicht mehr als 6 Tabletten pro Tag einnehmen. Nehmen Sie diese Tabletten nicht mehr als 5 Tage lang für Schmerzen oder 3 Tage lang für Fieber, ohne Ihren Arzt zu fragen. Falls die Symptome andauern, sehen Sie Ihren Arzt, um sicher zu stellen, dass sie nicht durch ein anderes Leiden bedingt sind.

Prendere una dose iniziale di 2 compresse all'apparizione dei sintomi. Se necessario, prendere in seguito 1 o 2 compresse ogni 4 o 6 ore. Non prendere le compresse per più di 5 giorni contro i dolori o 3 giorni contro la febbre senza consultare il suo medico. Se i sintomi persistono, consulti il suo medico per accertare che non sono dovuti ad un'altra malattia.

Take an initial dose of 2 tablets when symptoms appear. If needed, continue with 1 or 2 tablets every 4 to 6 hours. Do not take for more than 6 tablets per day. Do not take for more than 5 days for pain or 3 days for fever without consulting your doctor. If symptoms persist, consult your doctor to make sure that they are not due to another illness.

PA:

88888



Médicament pour essai clinique
Zur klinischen Prüfung bestimmt
Solo per studio clinico
For clinical use only

Ne pas ouvrir dans la pharmacie.
Ne pas accepter un emballage déjà ouvert.
Nicht in der Apotheke zu öffnen.
Eine geöffnete Schachtel ist zurückzuweisen.
Rifutare nella farmacia.
Not to be open in the pharmacy.
Do not accept if package is open.

Tenir hors de portée des enfants/d'autres personnes.
Für Kinder/andere Personen unerreichbar aufbewahren.
Keep out of the reach of children/other people.

Lot/Lotno/Batch 35229/29964/81002/476304
Date d'expiration/Verwendbar bis/Scadenza/Expiry date: 02.2004

D . I . A . M . O . N . D . S .

Dès l'apparition des symptômes, prendre une dose initiale de 2 comprimés. Si nécessaire, prendre ensuite 1 ou 2 comprimés toutes les 4 à 6 heures. Ne pas prendre plus de 6 comprimés par jour. Ne pas dépasser 5 jours de traitement en cas de douleurs ou 3 jours en cas de fièvre. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin afin de vous assurer qu'ils ne sont pas dus à une autre maladie.

Nehmen Sie eine Anfangsdosis von 2 Tabletten, sobald die Symptome auftreten. Falls erforderlich, nehmen Sie zusätzlich 1 oder 2 Tabletten alle 4 bis 6 Stunden. Sie dürfen nicht mehr als 6 Tabletten pro Tag einnehmen. Nehmen Sie diese Tabletten nicht mehr als 5 Tage lang für Schmerzen oder 3 Tage lang für Fieber, ohne Ihren Arzt zu fragen. Falls die Symptome andauern, sehen Sie Ihren Arzt, um sicher zu stellen, dass sie nicht durch ein anderes Leiden bedingt sind.

Prendere una dose iniziale di 2 compresse all'apparizione dei sintomi. Se necessario, prendere in seguito 1 o 2 compresse ogni 4 o 6 ore. Non prendere le compresse per più di 5 giorni contro i dolori o 3 giorni contro la febbre senza consultare il suo medico. Se i sintomi persistono, consulti il suo medico per accertare che non sono dovuti ad un'altra malattia.

Take an initial dose of 2 tablets when symptoms appear. If needed, continue with 1 or 2 tablets every 4 to 6 hours. Do not take for more than 6 tablets per day. Do not take for more than 5 days for pain or 3 days for fever without consulting your doctor. If symptoms persist, consult your doctor to make sure that they are not due to another illness.

PA:

88888

D . I . A . M . O . N . D . S .



Médicament pour essai clinique
Zur klinischen Prüfung bestimmt
Solo per studio clinico
For clinical use only

**Ne pas ouvrir dans la pharmacie.
Ne pas accepter un emballage déjà ouvert.
Nicht in der Apotheke zu öffnen.
Eine geöffnete Schachtel ist zurückzuweisen.
Rifutare nella farmacia.
Not to be open in the pharmacy.
Do not accept if package is open.**

Tenir hors de portée des enfants/d'autres personnes.
Für Kinder/andere Personen unerreichbar aufbewahren.
Keep out of the reach of children/other people.

Novartis Consumer Health SA, 1260 Nyon, Switzerland

17727A-510.10-01-00-CH+F

Lot/Lotno/Batch 35229/29964/81002/476304
Date d'expiration/Verwendbar bis/Scadenza/Expiry date: 02.2004